


## Nowe stanowiska *Fellhanera subtilis* (Pilocarpaceae, Lichenes) na południu Polski

W czasie badań terenowych nad porostami piętra kosodrzewiny na Babiej Górze (w latach 1999–2000), odnaleziono nowe stanowiska *Fellhanera subtilis* (Vězda) Dieder. & Sérus. Jest to niezauważany dotychczas, ale stosunkowo częsty gatunek porostu, rosnący zwykle na gałązkach *Vaccinium myrtillus*.

Z obszaru Polski *Fellhanera subtilis* podana została z północy – Słowiński Park Narodowy, Bory Tucholskie (MIĄDLIKOWSKA 1997) oraz z Gorców (MIĄDLIKOWSKA 1997; CZARNOTA 2000). Niewielka do tej pory liczba publikowanych stanowisk tego taksonu w naszym kraju wynika z faktu, że jest to porost o mikroskopijnych rozmiarach, często niedostrzegany w terenie. Poza tym, krzewinki borówki dopiero od niedawna są sprawdzane jako siedlisko dla porostów.

Nowo odnalezione stanowiska *Fellhanera subtilis* zlokalizowane są na północnych i na południowych stokach Babiej Góry, w obrębie piętra regla górnego oraz w piętrze kosodrzewiny (Ryc. 1).

Na badanym terenie gatunek ten znajdowano na rozrośniętych krzewinkach *Vaccinium myrtillus*, zarówno u nasady gałązek, tuż nad ściółką, jak i w górnych partiach starszych odgałęzień.



Ryc. 1. Stanowiska *Fellhanera subtilis* (Vězda) Dieder. & Sérus na Babiej Górze.

Fig. 1. Localities of *Fellhanera subtilis* (Vězda) Dieder. & Sérus in the Babia Góra massif.

*Wykaz stanowisk:* Polska, Beskidy Zachodnie, Pasma Babiej Góry: południowe stoki Babiej Góry, granica polsko-słowacka, koło słupka granicznego 76/4, na *Vaccinium myrtillus*, 1030 m, **DG 2638**, Węgrzyn 5 (KRA-L); Babia Góra, Przełęcz Brona, na *V. myrtillus* 1400 m, **DG 1697**, Węgrzyn 173 (KRA-L); Babia Góra, Izdebczyska, na *V. myrtillus*, 1450 m, **DG 2607**, Węgrzyn 167 (KRA-L); Babia Góra, szlak czerwony, pomiędzy Sokolicą a Kępą, na *V. myrtillus*, 1400 m, **DG 1790**, Węgrzyn 204 (KRA-L); Babia Góra, Sokolica, na *V. myrtillus*, 1367 m, **DG 1790**, Węgrzyn 222 (KRA-L).

**Podziękowania.** Bardzo serdecznie dziękuję Pani Doktor Lucynie Śliwie za uwagi przy opracowywaniu manuskryptu.

**Summary. New records of *Fellhanera subtilis* (Pilocarpaceae, Lichenes) in southern Poland.** During research of lichens in the Babia Góra massif a new localities of *Fellhanera subtilis* (Vězda) Dieder. & Sérus occurring on *Vaccinium myrtillus* branches were found. In Poland the species was till now recorded from northern part of the country (Słowiński National Park, Tuchola Forest) and from the Gorce Mts (Western Carpathians).

#### LITERATURA

CZARNOTA P. 2000. Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego Część I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków. – Parki Nar. i Rez. Przynr. **19**.1: 3–73

MIADLIKOWSKA J. 1997. Lichens on *Vaccinium myrtillus* in Poland. – Graphis Scripta **8**: 1–3.

MICHAŁ WĘGRZYN, *Instytut Botaniki, Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej, Uniwersytet Jagielloński, Kopernika 27, PL-31-501 Kraków; e-mail: wegrzyn@ib.uj.edu.pl*

*Przyjęto do druku: 17.12.2001 r.*

## **Nowe stanowisko rzadkiego wątrobowca *Haplomitrium hookerii* (Hepaticae, Calobryales) w Polsce**

*Haplomitrium hookeri* (Sm.) Nees jest bardzo charakterystycznym wątrobowcem o jasnozielonej barwie, ortotropowym wroście, osiągającym wysokość około 1 cm. Rośnie zwykle pojedynczo lub małymi grupami pomiędzy innymi mchami i wątrobowcami, dlatego też odnalezienie tego gatunku jest – jak pisze EVANS (1917) – bardzo trudne i przynosi każdemu odkrywcy wielką satysfakcję.

W maju 2000 r. na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Karpaty Wschodnie), w dolinie potoku Wołosatego w drodze na Kiczere Manzina [**GG7010**] – odnaleziono zostało nowe stanowisko *Haplomitrium hookeri* (*Haplomitriaceae*, *Calobryales*) (Ryc. 1). Stanowisko to znajduje się na wysokości 740 m n. p. m. Zebrany przez autorkę materiał zawiera około 20 łodyżek, wśród których zaobserwowano rośliny męskie z młodymi plemniami.

Poniżej przedstawiono zdjęcie fitosocjologiczne wykonane na piaszczysto-gliniastej skarpie, w miejscu, gdzie odnaleziono nowe stanowisko: